

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL 160 F - Régist. pour Recettes D.R.A.T. - CCP DION 35 06 28 0



☎ 80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 16 - 07 Juin 1989

COLZA*Alternaria : localement symptômes sur siliques***POIS**

Protection tordeuse en secteurs concernés

C O L Z A**ALTERNARIA**

SITUATION : Il n'y a eu que peu de progression observée cette semaine. En général, la présence d'*Alternaria* reste faible mais là où elle avait été notée sur feuilles hautes, la maladie est maintenant bien implantée sur siliques (notamment dans certains secteurs de la Vallée du Doubs).

PRECONISATION : Continuer à surveiller, surtout en cas de retour des périodes chaudes. Un traitement est envisageable jusque 3 semaines avant la récolte. Ce qui devrait situer la période limite d'intervention aux alentours du 20 Juin. Mais dans la plupart des cas, si une intervention se justifie, elle devrait être effectuée rapidement.

P O I S

STADES : fin floraison atteinte ou proche en général.

Pour un certain nombre de situations, la période chaude et sèche a entraîné des avortements importants, limitant la production de gousses à 2 ou 3 étages.

SITUATION :

Pucerons : populations très irrégulières, souvent limitées, mais atteignant localement le seuil d'intervention (30 pucerons par plante).

Tordeuses : poursuite assez inégale du vol, les faibles températures ont souvent limité les captures. Peu de secteurs ont actuellement franchi le seuil de 200 captures cumulées (Epoisses, Champdôtre en Côte d'Or). Les captures signalées dans les autres secteurs sont de l'ordre de quelques dizaines et excèdent rarement une centaine.

Maladies : peu de progression de l'Anthracnose, quelques symptômes de botrytis commencent à être observés sur feuilles, voire sur gousses, à partir des anciennes pièces florales.

PRECONISATION :

Pucerons : n'intervenir que si le seuil de 30 pucerons par plante est atteint.

Tordeuse : dans les secteurs où les captures cumulées sont d'au moins 200 pucerons, une intervention pourra être envisagée dans la semaine prochaine (12 au 17 juin).

Maladies : l'opportunité du renouvellement de la protection fongicide, 15 à 20 jours après la première intervention, est à apprécier suivant l'importance du botrytis présent et suivant l'évolution des conditions météorologiques : le retour d'un temps sec limiterait l'évolution de la maladie, la persistance de conditions humides, ou contraire, favorisent son développement.

P. 23

M A I S

STADES : 4 - 6 feuilles fréquemment observées.

SITUATION :

Noctuelles : des dégâts sont parfois notés en particulier en Val de Saône.

Pucerons : la présence de quelques pucerons ailés est parfois observée. Les niveaux atteints sont toujours faibles.

PRECONISATION :

En présence de noctuelles, une intervention par pulvérisation ou par appâts est à réaliser rapidement.

Pour obtenir une certaine efficacité, la pulvérisation est à réaliser à la tombée de la nuit en apportant un volume d'eau de 800 à 1 000 l/ha. Les appâts donnent, dans l'ensemble, une efficacité plus irrégulière.

Pour le choix des produits, consulter le dépliant "maïs".

*

*

*